



Prise en charge podologique du Syndrome Mains/Pieds induit par les thérapies moléculaires ciblées

Fiche de suivi et référentiel AFSOS

Mme Agnès Taugourdeau, podologue à Chartres

Mme Sylvie PELLETIER, cadre coordinatrice ONCO 28

Référentiel AFSOS

Référentiels Inter régionaux en Soins Oncologiques de Support

Prise en charge
du syndrome main-pied
induit par
le sunitinib et le sorafenib

Molécules responsables

- Inhibiteurs tyrosine kinase

- ✓ Sunitinib : Sutent ® (tumeurs Stromales Gastro Intestinales, rein métastatique, neuroendocrine du pancréas)

- ✓ Sorafenib : Nexavar ® (rein métastatique, hépatocarcinome)

- ✓ Régorafénib : Stivarga ® (CCR métastatique, GIST)

- Inhibiteurs de la voie MAP Kinase

- ✓ Trametinib : Mékinist ® (mélanome métastatique)

- ✓ Vemurafenib : Zelboraf ® (mélanome métastatique)



Soins dérogatoires ONCO 28

- Podologues adhérents au réseau
- Patient sous traitement oral, thérapies ciblées
- Patient domicilié en Eure et Loir
- Soins dérogatoires financés par le réseau
- 6 consultations à 30 € la séance

Département

Organisme d'affiliation :

CPAM

MSA

Prof. Indépendantes

Autres

Cachet du podologue



Tél: 02.37.18.59.98

FICHE DE SUIVI ET EVOLUTION DES SOINS PODOLOGIQUES Syndrome mains/pieds thérapies ciblées en cancérologie

Nom :

N° de sécurité sociale :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Nom du médecin traitant

Oncologue :

Adresse :

Date du bilan :

traitement ciblé actuel

Exemple : AVASTIN

du patient :

Date de séance	Lésion	Soins codés	localisation	Douleur	Détail des soins	Observations	Signature du patient attestant des soins

Evolution après 4 séances :

.....

Lésions:

- I : Inflammatoire
- E : Erythème
- O : Œdème, bulles
- D : Desquamation

Douleur : échelle NCI-CTC V4

- Grade I
- Grade II
- Grade III

Localisation hyperkératose :

- M : métatarsienne
- PA : palmaire
- PL : plantaire
- PU : pulpaire
- T : talonnière

Rappel des soins prophylactiques codés :

- A : Lésions unguéales
- B : Hyperkératose
- C : Mycoses
- D : Orthoplastie
- E : Education du patient

Echelle NCI-CTC V4 :

Syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire

	Définition du terme CTCAE v4.0	Grade I	Grade II	Grade III
Syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire	Trouble caractérisé par une rougeur, une gêne marquée, un gonflement et des picotements dans les paumes des mains ou la plante des pieds.	Modifications légères de la peau ou dermite légère (érythème, œdème, ou hyperkératose) sans douleur	Modifications cutanées (exfoliation, bulles, saignement, œdème ou hyperkératose) avec douleur, interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne	Modifications cutanées sévères (exfoliation, bulles, saignement, œdème ou hyperkératose) avec douleur, interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne